

35g



IMIDASECT

GEGEN SCHABEN

BEIGEFÜGTE PRODUKTINFORMATION BEACHTEN!

Konzentration: 2,15% w / w
Wirkstoff: Imidacloprid

Zielinsekten: Schaben (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Periplaneta americana*)

Dosierung:

ZIELARTEN	NORMALER BEFALL	STARKER BEFALL
Deutsche Schabe oder Braunbandschabe	1 Gelpunkt pro m ²	2 Gelpunkte pro m ²
Orientalische oder Amerikanische Schabe	2 Gelpunkte pro m ²	3 Gelpunkte pro m ²

Hinweis: 1 Gelpunkt von 0,1 g hat einen Durchmesser von ca. 5 mm.

Vorsichtsmaßnahmen: Nach der Verwendung von IMIDASECT und vor dem Essen Hände mit Seife und Wasser gründlich waschen. Verwenden Sie das Gel nicht auf Oberflächen, auf denen Lebensmittel gelagert, hergestellt oder verbraucht werden. Schützen Sie Lebensmittel, Kochutensilien und Besteck vor Kontamination mit dem Gel. Unter Verschluss und für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Das Gel nicht in die Kanalisation und über Wasserwege gelangen lassen.

Vertreiber



Umweltgefährlich

vermeiden.
 S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
 S35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden
 S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
 S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen)
 S61 Freisetzung in die Umwelt. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Notfallauskunft: Deutschland: bei allgemeinen Notfällen (Unfall, Brand, Umwelt- / Ökologieereignisse): +49 (0) 69 2222 52 85
 bei Vergiftungen (Giftnotrufzentrale Mainz): +49 (0) 6131 19240

Osterreich: Tel. +43-(0)1-4064343
 Bei Vergiftungsverdacht Arbeiten sofort unterbrechen und ärztlichen Rat einholen sowie Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Registrier-NR.: N-52696

Hersteller
 Sharda Cropchem Ltd, Dominic Holm,
 29th Road, Bandra (west), Mumbai, Indien.
 Tel.: 0091 22 66782800
 Fax: 0091 22 66782828 / 66782808

