

IMIDASECTANTS



▶ GELOVÁ NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM IMIDACLOPRID 0,1g/kg (0.01%)

Upozornění: PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO ETIKETU. Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní opatření a doporučené dávkování a všechny podmínky bezpečného používání. Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. Při používání gelu by měla být dodržována všechna pravidla bezpečnosti práce, za niž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na všechny factory a podmínky, v nichž je gel aplikován. Výrobce zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, že byl prodán v originálním balení, skladován a používán doporučeným způsobem.

MZDR 21644/2013/SOZ

S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

První pomoc: Kontaminovaný oděv ihned svlékněte.

Při kontaminaci kůže umyjte ihned velkým množstvím vody a mýdla.

Při zasažení oka/očí vypláchněte ihned vodou a kontaktujte lékaře.

Při náhodném požití vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (*Monomorium pharaonis*), mravencům dřnovým (*Tetramorium caespitum*), mravencům obecným (*Lasius niger*) a mravencům domácím (*Lasius emarginatus*)

Mechanismus účinnosti: Účinná látka imidacloprid patří mezi nitroguanidiny a v těle hmyzu se váže na neurony. Tato vazba narušuje přenos nervových impulsů, což je pro zasažený hmyz smrtelné.

Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu. Dělnice donášejí gel do hnízd a distribuují jej mezi ostatní příslušníky kolonie. Gel účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé mravence.

Návod k použití: Ve vnitřních prostorech umísťte gel ve formě kapek nebo tenkých linek na místa, kde se mravenci vyskytují, tj. do blízkosti cestiček mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají potravu a vodu, do blízkosti míst, kde pronikají do místností, nebo do blízkosti vchodů do jejich hnízd. V místech, kde je jen podezření na výskyt mravenců, nebo kde se mravenci vyskytují zřídka, umísťte gel do vhodné insekticidní stanicky.

Mimo vnitřní prostory umísťte gel ve formě kapek nebo tenkých linek do hnízd mravenců, nebo na jejich cestičky jen v případě, že mravenci pronikají do vnitřního prostoru. V případě, že jde jen o podezření na výskyt a aktivitu mravenců, umísťte gel do insekticidních stanic, aby byl chráněn před deštěm a jinými vnějšími vlivy.

Kde je to možné, odstraňte všechny ostatní zdroje potravy mravenců, aby mravenci ochotněji gel konzumovali.

Účel použití: Nástraha IMIDASECT ANTS je určena k použití v těchto podmínkách: V obytných prostorech: zejména v kuchyních. V potravinářských provozovnách: výrobnách, kuchyních veřejného stravování, jatkách, skladech, prodejnách, restauracích apod.

Ve veřejných budovách: ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod.

Dávkování: Ve vnitřních prostorech: Mravenc faraón a mravenc dřnový: 1-2 kapky gelu na 1 m². Mravenc obecný a mravenc domácí: 1 kapka gelu na 1 m jejich cestičky. Aplikované kapky gelu by měly mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2 g).

Ve venovním prostoru:

Používejte pouze proti mravencům, kteří pronikají do vnitřního prostoru. Mravenc obecný a mravenc domácí: 1 kapka gelu do blízkosti vchodu do hnízda nebo do blízkosti cestičky mravenců. Aplikovaná kapka by měla mít průměr asi 1 cm (asi 0,2g).

Poznámky:

Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně uklizena a při úklidu by mohl být gel přemístěn na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s potravinami, nebo zničen. Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, protože voda gel poškodí. Neaplikujte gel na místa čerstvě ošetřená postřikem insekticidů. Aplikovaný gel nepostupuje žádnými insekticidy. Gel může poškozovat barvu textilních tkanin.

Bezpečnostní opatření: Po práci s přípravkem IMIDASECT ANTS a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem. Neaplikujte do blízkosti nebalených potravin. Neaplikujte gel na povrchy na nichž jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány. Během aplikace chraňte potraviny, nádobí a jídelní přístroje před kontaminací gelem. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků.

Skladování: Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku: Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.



Číslo šarže a datum výroby: viz obal.
Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Výrobce: SHARDA Europe b.v.b.a.
Jozef Mertenstraat 142,
1702 Dilbeek
BELGIQUE

Dovozce a distributor v ČR:

