



▶ GELOVÁ NÁSTRAHA PROTI RUSŮM S ŠVÁBŮM



Nebezpečný pro životní prostředí

R51/53: Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 S2: Uchovávejte z dosahu dětí
 S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
 S20/21: Nejezte, nepijte a nekurte při používání.
 S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
 S29: Nevylévejte do kanalizace
 S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
 S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)
 S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
 S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc:

Obecná doporučení: Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Pokud je pravděpodobné, že pacient ztratí vědomí, transportujte jej k lékaři ve stabilizované poloze na boku. Odstraňte ihned kontaminované nebo nasáklé oblečení
 Při zasažení kůže: Ihned umyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Při zasažení očí vymyjte důkladně vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
 Při polknutí: Nevylévejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Insekticidní nástraha ve formě gelu k přímému použití proti rusu domácímu (*Blattella germanica*), švábu obecnému (*Blatta orientalis*), švábu hnědopásému (*Supella longipalpa*) a švábu americkému (*Periplaneta americana*) a jejich nymfám.

Účinná látka: Imidacloprid 21,5 g/kg (2,15%)
Vzhled přípravku: Hnědý gel

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 17834/2013/SOZ

Upozornění:

Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití, dodržujte doporučené dávkování a všechny podmínky v něm doporučené. Výrobce zaručuje kvalitní přípravku pokud je v originálním obalu a používán doporučeným způsobem. Dodržujte pokyny abyste se vyvarovali ohrožení zdraví lidí a poškození životního prostředí.
 Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravin
 Neaplikujte nástrahu do blízkosti potravin, jídelních příborů a nádobí ani na plochy s nimi přicházející potraviny do kontaktu.

Mechanismus účinnosti:

Imidacloprid, účinná látka přípravku Imidasect patří mezi neonicotinoidy, se váže na neurony hmyzu. Tato vazba působí narušení přenosu nervových impulsů, což je pro hmyz smrtelné.
 Rusi a švábi jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu. Gel působí požerově i kontaktně a dospěle i nymfy. K uhynutí dochází během 10 dní. Hynou i rusi a švábi požírající v úkrytech trus jedinců, kteří mimo úkryt gel požili. Gel alikovaný za normálních podmínek zůstává pro švábi a rusi atraktivní a účinný po dobu 2 měsíců.

Návod k použití:

Před aplikací přípravku Imidasect odstraňte pokud možno všechny přirozené zdroje potravy rusů a švábů z ošetřovaného prostoru, včetně odpadků. Přípravek aplikujte na všechna místa, kde je teplota nižší než 50 0 C, kde se rusi a švábi ukrývají a vyhledávají potravu a vodu, tj. do rohů místnosti, do prasklin, dutin a škvír, rozvodů klimatizace, pod lišty podlahy, pod přístroje, pod rozvody vody apod. Při kontrolách gel podle potřeby doplňujte. Gel může být do prostředí aplikován bez nutnosti přerušovat jakékoliv činnosti a aktivity.

Imidasect může být používán uvnitř budov všech typů, v bytech, restauracích, kuchyních veřejného stravování, potravinářských výrobních a provozovacích, hotelech, školách, zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích, skladech, v pumyslých objektech apod.

Aplikační dávky:

Druh hmyzu	Při mírnějším zamoření	Při silném zamoření
Rus domácí Šváb hnědopásý	1 kapka o hmotnosti 0.1 g/m2	2 kapky o hmotnosti 0,1 g/m2
Šváb obecný Šváb americký	2 kapky o hmotnosti 0,1 g/m2	3 kapky o hmotnosti 0,1 g/m2

Poznámka: 1 kapka o hmotnosti 0,1 g má průměr 5mm

Naplikujte nástrahu na místa často uklizená, kde může být zničena nebo odstraněna.
 Neaplikujte nástrahu na místa omývaná vodou, která může nástrahu poničit.
 Neaplikujte nástrahu na plochy ošetřené postřikem insekticidů.
 Aplikovanou nástrahu nepoškrábte insekticidními přípravky.
 Nástraha může působit odbarvení textilu.

Bezpečnostní opatření:

Po použití přípravku Imidasect a před jídlem si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 Neaplikujte gel na plochy, kde jsou nebalené potraviny uloženy, upravovány nebo konzumovány.
 Chraňte potraviny, kuchyňské potřeby a přístroje před kontaminací během použití.
 Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům. Toxický pro ryby. Neznečišťujte vodní nádrže, vodní toky nebo kanalizaci přípravkem nebo jeho obaly.

Skladování:

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, mimo dosah dětí a domácích zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevstavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40° C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Přípravek z obalu úplně spotřebte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.



Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Výrobce: SHARDA Europe b.v.b.a.

Jozef Mertenstraat 142

1702 Dilbeek

Belgium

Dovozce do ČR:

