

1Kg

SOFAST



▶ GRANULOVANÁ NÁSTRAHA PROTI MUCHE DOMOVEJ

Imidacloprid 5g/kg

Výrobca:
ShardaEurope b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Dovozca do SR:



PRÍPRAVOK JE URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené pod zn:

bio/778/D/13/3/ CCHLP

Formulácia: Granule (GR)

Účinná látka: imidacloprid

Koncentrácia účinnej látky: 5 g / kg

Chemická skupina: Nitroguanidiny (Neonicotinoidy)

Prípravok je určený pre profesionálne použitie

Vzhľad prípravku: Biele granule so slabým charakteristickým zápachom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Prípravok používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu.

N



NEBEZPEČNÝ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obsahuje (Z)-9-tricosene, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S22 Nevdychujte prach.

S23 Nevdychujte pary/aerosóly.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S37 Noste vhodné rukavice.

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

S60 Tento materiál a jeho obaly musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:

Nepoužívajte v blízkosti nebalených potravín.

Nepoužívajte prípravok v blízkosti potravín, riadu a povrchov, ktorých prichádzajú do styku s potravinami.

Dodržiujte presne návod na použitie, bezpečnostné opatrenia a odporúčané dávkovanie a všetky podmienky bezpečného

používania. Prípravok používajte iba na účely, pre ktoré je určený. Pri používaní tohto prípravku by mali byť dodržiavané všetky pravidlá bezpečnosti práce, za ktorú máte plnú zodpovednosť, s ohľadom na všetky faktory a podmienky, za ktorých je prípravok aplikovaný.

Výrobca zodpovedá za kvalitu a účinnosť prípravku len v prípade, že bol predaný v originálnom balení, skladovaný a používaný odporúčaným spôsobom.

Zabráňte kontaminácii vodných nádrží, vodných tokov prípravkom alebo jeho prázdnyimi obalmi. Prípravok je vysoko toxický pre všetky zasiahnuté priamo postrekom, alebo reziduami prípravku na kvetoch a rastlinách.

Spôsob účinku: Účinná látka imidacloprid patrí medzi nitroguanidiny a v tele hmyzu sa viaže na neuróny. Táto väzba narušava prenos nervových impulzov, čo je pre zasiahnutý hmyz smrteľné.

Muchy sú lánané potravínovými atraktantmi, cukrom a feromónom (Z)-9-trikosen, ktoré sú obsiahnuté v granulách a ktoré muchy lákajú. Prípravok spôsobuje ich hynutie požerom i kontaktne.

Spôsob výroby prípravku SOFAST zaručuje vynikajúce rozptýlenie účinnej látky a feromónu v prípravku, čo spôsobuje, že je pre muchy vysoko účinný a atraktívny. Prípravok obsahuje horkú látku, ktorá bráni jej prijímanie necielovými druhmi a domácimi zvieratami.

Návod na použitie:

Spôsob použitia:

1. Nástraha môže byť bez úprav rozspaná na vodorovné plochy (napr. okenné rímky, alebo plytké misky) v dávke 200 g na 100 m² podlahovej plochy.

2. Nástraha môže byť bez úprav aplikovaná na misky, bez toho, aby sa tvorili kôpkky. Umiestnite jednu misku s nástrahou na každých 10m² podlahovej plochy, najlepšie na vyvýšené miesta (police, rímky, steny). Kontrolujte nástrahu každé 2 až 3 dni, obnovte ju, ak sú granule pokryté prachom. Pre vyššiu účinnosť sa odporúča granule mierne navlhčiť vodou.

3. Nástraha môže byť aplikovaná tlakovým postrekačom. Zmiešajte 100 g granúl so 100 ml vody. Získanú zmes dobre premiešajte a nechajte odstáť aspoň 15 minút. Pomocou tlakovej postrekača aplikujte zmes maximálne 7-8 hodín po jej príprave na neporézne povrchy, kde muchy zvyčajne sadajú.

4. Nástraha môže byť aplikovaná náterom na steny a zvislé plochy. Zmiešajte 200 g granúl so 150 ml vody. Získanú zmes dobre premiešajte a nechajte odstáť aspoň 20 minút. Aplikujte pomocou štetca alebo valčeka, maximálne 7-8 hodín po jej príprave na neporézne povrchy, kde muchy zvyčajne sadajú.

Vnútorne a vonkajšie použitie: objekty a farmy živočíšnej výroby, chovy domácich a hospodárskych zvierat, zoológické záhrady,

domácnosti, reštaurácie, a všetky miesta, kam muchy vo väčšom počte naletujú a kde žijú.

Aplikačná dávka:

Priemerné dávkovanie: 200 g prípravku stačí na ošetrenie 100 m² podlahovej plochy.

Nepoužívajte prípravok na miestach, na ktorých môže pravidelné čistenie spôsobiť jeho premiestnenie na povrchy, kde môže dôjsť do kontaktu s potravinami.

Nepoužívajte prípravok na miestach pravidelne čistných vodou, pretože voda môže prípravok poškodiť.

Nepoužívajte prípravok na miestach nedávno postriekanych insekticidom.

Na miesta ošetrená týmto prípravkom neaplikujte žiadne insekticídne postreky.

Aplikačia prípravku na textil môže spôsobiť odfarbenie

Prvá pomoc:

Všeobecné odporúčania: Postihnutého vynesť z nebezpečného priestoru. Ak je pravdepodobné, že pacient stratí vedomie, pripravujte ho k lekárov v stabilizovanej polohe na boku. Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte.

Pri kontaminácii kože umyte ihneď veľkým množstvom vody a mydla.

Pri zasiahnutí oka / očí vypláchnite ihneď vodou a kontaktujte lekára.

Pri prehltnutí vyhľadajte ihneď lekárske ošetrenie.

Dôležitá informácia: Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným toxikologickým informačným centrom, FNSP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: 421 254 774 166
Fax: 421 254 774 605

Mobil: 421 911 166 066

e-mail: ntic@ntic.sk

Skladovanie:

Prípravok skladujte v chladných a suchých priestoroch, v ktorých nemôže dochádzať ku vzájomnej kontaminácii s inými biocidmi alebo pesticidmi, hnojivami, potravinami alebo krmivami. Skladujte v originálnych obaloch, mimo dosahu detí a domácich zvierat, v uzamknutých skladoch. S prípravkom nakladajte a obaly s ním otvárajte tak, aby nedochádzalo k unikaniu prípravku do okolia.

Odstraňovanie obalov a zvyškov prípravku:

Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte ani po vypláchnutí na iné účely. Prázdne obaly a zvyšky prípravku odstraňujte ako nebezpečný odpad.

Balenie: 1 kg

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

