



► **BIOCIDNI PRIPRAVAK, INSEKTICID  
ZA SUZBIJANJE GMIŽUĆIH INSEKATA.**

**OPASNO ZA OKOLIŠ**

S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane  
S22 Ne udisati prašinu  
S24/25 Sprječiti dodir s kožom i očima  
S29/35 Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način  
S37 Nositi zaštitne rukavice  
S40 U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu)  
S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik  
S56 Kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na posebna odlagališta opasnog  
S60 Ostaci kemikalija i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad  
S61 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehničkog lista

Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

**Vlasnik rješenja o registraciji:** Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Mumbai, India  
**Zastupnik:** Euroazijski pesticidi d.o.o., Savska cesta 64/3, Zagreb  
**Distributer:**

**Rješenje o stavljanju u promet i upis u registar biocidnog pripravka:**  
MZ RH, Klasa: UP/I-543-04/12-05/136,  
Ur.broj: 534-09-1-1-4/15-13-3 od 07.06.2013.

**Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.**  
**Rok trajanja:** pri normalnim uvjetima skladištenja 2 godine  
**Prije uporabe pročitati priloženu uputu.**

**UPUTA ZA UPORABU**

**Način primjene:** Aktivna tvar deltametrin priprada skupini piretroida, djeluje kontaktno i želučano blokirajući prijenos živčanih impulsa. Somi se upotrebljava direktnom primjenom u tankim linijama na mjestima gdje se insekti skrivaju (u kutevima prostorija, ispod namještaja i sl.).

**Doza primjene:**

-**Mravi:** Primjeniti 10 do 20 g Somi pripravka u leglo. Smrt nastupa u roku od 10 minuta. Ukoliko legla nisu dostupna, pripravak primijeniti na mjesta kojima se insekti kreću u dozi od 20 do 30 g po m<sup>2</sup>.  
Postupak ponoviti nekoliko puta u razmaku od tjedan dana.

-**Zohari, pauci, stjenice, buhe:** Primjeniti 20 do 30 g po m<sup>2</sup>.

**Područja primjene:**

okoliš i u prehrambenoj industriji (paziti da ne dođe u kontakt sa hranom)

**Mogućnosti miješanja:**

Ne preporuča se miješanje s drugim pripravcima.

**Ograničenja:**

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Sredstvo se ne smije primjenjivati u blizini vodenih tokova, odvodnih kanala i kanalizacije. Izbjegavati kontakt s tretiranim površinama. Ne primjenjivati u prisustvu drugih osoba ili životinja.

**Mjere zaštite pri radu:**

Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva. Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice ili masku za cijelo lice, zaštitne nepropusne rukavice od nitrila, zaštitno pamučno odijelo s dugim rukavima, zaštitnu obuću koja obuhvaća cijelo stopalo, po potrebi gumenu pregaču. Za zaštitu dišnog sustava potrebno je koristiti zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz lice.

Prihodom rada sprječiti udisanje izmaglice škropiva. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

**Simptomi trovanja:**

U slučaju udisanja može izazvati nadraživanje, kašalj. U dodiru s kožom izaziva nadraživanje sa simptomima crvenila, peckanja, te nealergijski kontaktni dermatitis nakon dulje uporabe. U slučaju dodira s očima može izazvati crvenilo, suzenje i bol. Nakon gutanja može izazvati vrtoglavicu, glavobolju, mučninu, povraćanje, grčenje mišića, bolove u trbuhu, probleme s probavom, pospanost, dezorijentiranost, nesvjesticu.

**Prva pomoć:**

Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koj se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu.

U slučaju udisanja osobu izvesti na svjež zrak. Ako ne diše, primjeniti umjetno disanje (ne direktno „usta na usta“) i odmah potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s kožom odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Prolivena mjesta dobro prati s puno vode uz dodatak sapuna,

najmanje 20 min. Ukoliko simptomi ne prestaju, potražiti pomoć liječnika.

Nakon dodira s očima čistim palcem i kažiprstom raširiti očne kapke i ispirati ih najmanje 10-15 minuta blagim mlazom vode. Izvaditi leće nakon prvih 5 minuta i nastaviti ispiranje. U slučaju boli i crvenila potražiti pomoć liječnika.

Nakon gutanja ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smjetnje pri disanju usnu supljinu ispirati većom količinom vode. Odmah potražiti pomoć liječnika, tj. transportirati u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

U slučaju trovanja nazvati Central za kontrolu otrovanja 01/23 48 342.

**Mjere zaštite u slučaju nezgode:**

U slučaju nesreće koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odjelo, zaštitne rukavice, samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom). Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Izbjegavati udisanje. Odmah evakuirati ljude iz zagađenog područja i provjetriti. Rasuto sredstvo pokupiti te prebaciti u odgovarajuće spremnike i držati na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto onečišćenja potom oprati vodom.

U slučaju većeg rasipanja te dolaska u okoliš, obavijestiti odgovornu osobu i/ili DUZS na broj 112.

Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti s gašenjem vodenom maglicom, suhim prahom ili s CO<sub>2</sub> uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom).

**Uputa za sigurno odlaganje pripravka i njegove ambalaže:**

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebjeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nakon primjene svu korišteni opremu dobro oprati.

**Skladištenje:**

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na hladnom, suhom i dobro zračenom mjestu, u zaključanoj posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

**Upozorenje:**

Proizvođač garantira za kvalitetu sredstva dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štete koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnog čuvanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.

