

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

GETOX ULTRA

Typ přípravku: 18

Číslo povolení: CZ-0002735-0000

Číslo žádosti: BC-PQ001399-19

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. Obchodní název (názvy) přípravku

Obchodní název (názvy)	DELTASECT 015 RTU
------------------------	-------------------

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgie
Identifikátor držitele povolení v R4BP (UUID)	ECHA-6ed0a0a5-254e-44cd-bb1b-8cd3d83fe14a	
Číslo povolení	CZ-0002735-0000	
Číslo povolení referenčního přípravku	PL-0002041-0000 (PL/2026/0724)	
Doba platnosti povolení	2.3.2036	

1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	Sharda Cropchem España S.L.
Adresa výrobce	Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina Nº3 Planta 12, 30006 Murcia Španělsko
Umístění výrobních závodů	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591 No. 10, 24040 Fornovo San Giovanni Itálie Sharda Cropchem España S.L. site 2 FERBI Srl Viale lo Maggio – C.da Ripoli, 64023 Mosciano S. Angelo Itálie Sharda Cropchem España S.L. site 3 Lérida Unión Química S.A. C/ Afueras s/n, 25173 Sudanell Španělsko Sharda Cropchem España S.L. site 4 Asplant - Skotniccy Spółka Jawna, 43600 Jaworzno Polsko Sharda Cropchem España S.L. site 5 Productos Flower, S.A. Pol. Ind. la Canaleta, 25300 Tárrega, Lleida Španělsko

1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	deltamethrin
Jméno (název) výrobce	Sharda Europe B.V.B.A (acting for Sharda Cropchem Limited (India))
Adresa výrobce	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W), 400050 Mumbai Indie
Umístění výrobních závodů	Sharda Cropchem Limited site 1 Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali (W) 400092 Mumbai Indie

2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Účinná látka	52918-63-5	258-256-6	0,0153 % (w/w)

2.2. Typ (typy) složení

AL jakákoli jiná kapalina (RTU – připraveno k použití).

3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah do sběrného místa nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy. P501: Odstraňte obal na sběrné místo nebezpečných nebo speciálních odpadů v souladu s místními, regionálními národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

4.1. Popis použití

Tabulka 1.

Snižování populace much v interiéru neprofesionálními uživateli

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Musca domestica</i> Obecný název: Moucha domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Stomoxys calcitrans</i> Obecný název: Stájové mouchy Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách V obytných prostorách: Domy a byty
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: Bodová aplikace na neporézní povrchy
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 50 ml/m ² Pro dávkování 50 ml přípravku stiskněte 65krát spoušť postřikovače. Počet a načasování aplikace: Účinnost přípravku se projeví po 1 týdnu. Účinnost až 8 týdnů. Maximálně 11 aplikací ročně.
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	Láhev (HDPE) se šroubovacím uzávěrem s pákovým rozprašovačem a ručním otevíráním a zavíráním trysky: 100 - 1000 ml.

4.1.1. Návod k danému způsobu použití

Určete místa, kde se hmyz obvykle usazuje (např. na okenních rámech, kolem oken a okrajů, na stěnách nebo stropech). Přípravek aplikujte pouze bodově na neporézní povrchy, které se pravidelně nečistí mokrou cestou.

K postřikovači musí být připojeno speciální postřikovací zařízení, např. postřikovací pistole s tryskou, která se zaměřuje na oblasti aplikace přípravku.

4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Viz oddíl 5.2

4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.3

4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.4

4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.5

4.2. Popis použití

Tabulka 2.

Snížení populace much v interiérech profesionály

Typ přípravku	PT18: Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	Insekticid
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: <i>Musca domestica</i> Obecný název: Moucha domácí Vývojové stadium: dospělci Latinský název: <i>Stomoxys calcitrans</i> Obecný název: Stájové mouchy Vývojové stadium: dospělci
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Domy a byty. Ve veřejných prostorách (např. kina, kasárna, hotely, restaurace, bary, jídelny, nemocnice, průmyslové prostory).
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání Podrobný popis: Bodová aplikace na neporézní povrchy.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 50 ml/m ² Pro dávkování 50 ml přípravku stiskněte 65krát spoušť postřikovače. Počet a načasování aplikace: Účinnost přípravku se projeví po 1 týdnu. Účinnost až 8 týdnů. Maximálně 11 aplikací ročně
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev (HDPE) se šroubovacím uzávěrem s pákovým rozprašovačem a ručně otevíranou a zavíranou tryskou: 100 – 2500 ml

4.2.1. Návod k danému způsobu použití

K postřikovači musí být připojeno speciální postřikovací zařízení, např. postřikovací pistole s tryskou, která se zaměřuje na oblasti aplikace přípravku.

Je nutné dodržovat metody integrované ochrany proti škůdcům, jako je kombinace chemických a fyzikálních metod ochrany a dalších opatření v oblasti veřejného zdraví, a to s ohledem na místní specifika (klimatické podmínky, cílové druhy, podmínky použití atd.).

Používejte střídavě přípravky s různými účinnými látkami a odlišnými mechanismy účinku, aby došlo k eliminaci odolných jedinců v populaci. Při přizpůsobování ošetření zohledněte životní cyklus a vlastnosti cílového hmyzu. Zejména se zaměřte na nejnáchylnější stádium škůdce, načasování aplikací a ošetřované plochy. Nepoužívejte přípravek v oblastech, kde existuje podezření na rezistenci vůči účinné látce (účinným látkám) obsažené (obsaženým) v tomto přípravku nebo kde je tato rezistence prokázána.

Kontrola účinnosti přípravku na místě: v případě potřeby je třeba prozkoumat příčiny snížené účinnosti, aby se zajistilo, že neexistuje rezistence, nebo aby se zjistila potenciální rezistence.

Pokud je požadována delší doba regulace, měla by se ošetření střídát s přípravky obsahujícími

účinné látky s různými způsoby účinku. V případě snížené účinnosti nebo podezření na vznik rezistence musí být používání přípravku okamžitě přerušeno.

4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

Určete místa, kde se hmyz obvykle usazuje (např. na okenních rámech, kolem oken a okrajů, na stěnách nebo stropech). Přípravek aplikujte pouze bodově na neporézní povrchy, které se pravidelně nečistí mokrou cestou. Ochranné oděvy by se neměly prát, ale likvidovat jako pevný odpad. Likvidace jednorázových ochranných oděvů po použití musí probíhat v souladu s platnými národními či regionálními předpisy.

Je třeba dodržovat kodexy (zásady) správné praxe.

4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.3

4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.4

4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5.5

5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

5.1. Návod k použití

DELTASECT 015 RTU je přípravek připravený k použití.

Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo příbalový leták a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Přípravek je dodáván v lahvích vybavených rozprašovačem. Před použitím přípravku nádobu několikrát protřepejte. Otevřete postřikovač nastavením symbolu postřiku a silně stiskněte páčku/spoušť.

Místo postřikované přípravkem důkladně vyvětrejte.

Zbylý přípravek bezpečně uschovejte pro další ošetření. Přípravek není určen k použití s jinými přípravky.

Nepoužívejte na lůžkoviny, oblečení a hračky. Nepoužívejte na kočky nebo předměty určené pro kočky.

Vyhnete se kontaktu s kůží/očima. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Nevstupujte do ošetřeného prostoru, dokud postřik nezaschne.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

Přípravky používejte v doporučených dávkách a intervalech. Vyhnete se nepřetržitému používání přípravku.

Použití biocidních přípravků lze kombinovat s dalšími sanitačními opatřeními. Informujte držitele povolení, pokud je aplikace neúčinná.

5.2. Opatření ke zmírnění rizik

Nepoužívejte (nenanášejte) přímo na potraviny, krmivo, pitnou vodu nebo nápoje nebo v jejich blízkosti a ani na povrchy nebo nádoby, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou nebo nápoji či hospodářskými zvířaty.

Udržujte kočky mimo ošetřené povrchy. Tento biocidní přípravek obsahuje deltamethrin, který může u koček vyvolat závažné nežádoucí reakce.

Nepoužívejte v místnostech, kde jsou akvária a/nebo terária.

5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích:

Pyretroidy [např. deltamethrin] mohou způsobit parestézii (pálení kůže bez podráždění).

Pokud příznaky přetrvávají: Vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu přípravku.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI INHALACI: V případě výskytu příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

nebo lékaře. **PŘI POŽITÍ:** Při výskytu příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Před dalším použitím svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a vyperte jej. Kůži omyjte vodou. Pokud dojde k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Při výskytu příznaků vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

První pomoc pro kočky

Deltamethrin může být pro kočky nebezpečný. Pokud dojde k expozici, okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře a ukažte mu obal.

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí:

Opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte šíření nebo vniknutí do životního prostředí (povrchové a podzemní vody), kanalizace, odvodnění atd. Při úniku je nutné použít ochranné bariéry a uzavření kanalizace. Pokud se vám nepodaří zajistit ochranu (úniky do vodních toků, kanalizace, odpadů), informujte místní úřady.

Metody a materiál pro omezení šíření a čištění:

Rozlitý přípravek pohlt'te chemicky inertním materiálem (např. pískem, kaolinem), seberte a uložte do těsných nádob k pozdější likvidaci jako nebezpečný odpad

5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu

Nelikvidujte jako domovní odpad. Nevypouštějte do kanalizace.

Nedovolte kontaminaci podzemních a povrchových vod. Vyprázdněnou nádobu nespalujte.

Vyprázdněnou nádobu nepoužívejte k jiným účelům, ani recyklaci.

Zbytky přípravku nebo prošlý přípravek a prázdné obaly odevzdejte autorizovanému sběrateli odpadu jako nebezpečný odpad.

Nemíchejte s jiným odpadem.

5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování

Skladujte v originálních, těsně uzavřených obalech na suchém a dobře větraném místě při pokojové teplotě, a to odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním zářením, teplem a vlhkostí. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Doba skladovatelnosti: 2 roky

6. DALŠÍ INFORMACE

Tento biocidní přípravek obsahuje deltamethrin, který je nebezpečný pro včely. Čistý obsah deltamethrinu v přípravku: 0,0151 g na 100 g.

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než výše uvedených, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402