

ALFA SECT

▶ INSEKTICID U OBLIKU KONCENTRIRANE SUSPENZIJE ZA
SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA

Vrsta biocidnog pripravka: 18
Sadrži aktivnu tvar: α -cipermetrin 5.93% w/w (60 g/l)
CAS : 67375-30-8
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

1L



ZA PROFESIONALNU UPORABU

ALFA SECT



INSEKTICID U OBLIKU KONCENTRIRANE SUSPENZIJE ZA SUZBIJANJE LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA



Vrsta biocidnog pripravka: 18
Sadrži aktivnu tvar:
alpha-cipermetrin 5,93% w/w (60 g/l)
CAS : 67375-30-8
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)

Oznake upozorenja:
H302 Stetno ako se proguta.
H410 Vrlo otrovno za vodení okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:
P264 Nakon uporabe temeljito oprati vodom
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P330 Ne ispirati usta.
P391 Sakupiti proliveno.
P501 Odložiti sadržaj spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Glavnik rješenja o registraciji:
Sharda Cropchem Limited
Domnic Hoth 29th Road,
Bandra (West),
Mumbai-400050, India

UPOZORENJE

Zastupnik za RH: Euroazijski pesticidi d.o.o.
Savska cesta 64/3, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 1 2221200

Distributer:

Rješenje o stavljanju u promet i upis u registar biocidnog pripravka: Klasa: UP/1-543-04/154/05/200, URBROJ: 11-4/2-14-3 od 27.12.2014.
Namjena biocidnog pripravka: insekticid za suzbijanje letućih i gmižućih insekata.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

Rok trajanja: pri normalnim uvjetima skladištenja 2 godine.

Neto količina: 1 L

Prije uporabe pročitati priloženu uputu.

Nacin djelovanja

Aktivna tvar alfa-cipermetrin, koja pripada kemijskoj skupini piretroida, nestimulirajući je insekticid kontaktnog i želučanog djelovanja. Djeluje na centralni i periferni živčani sustav u vrlo niskim dozama.

Ciljani insekti

Leteci insekti: muhe, komarci, molci
Gmižuci insekti: zohari, mravi, krevetne stjenice, buhe
Proizvod se također može primijeniti u peradijancima za suzbijanje crvene kokoške tekuti ili grnje i manjeg bršnara.

UPUTA ZA UPORABU

Doza za rutinsko suzbijanje gmižućih i letućih insekata: 25 ml proizvoda potrebno je razrijediti u 5 l vode, 1 litru radne otopine primijeniti na 20m² površine.

Dvostruka doza: za primjenu gdje je potrebno izrazito rezidualno djelovanje i/ili na zaprljanim površinama ili na površinama koje jako apsorbiraju: 50 ml proizvoda razrijediti u 5 l vode, 1 litru radne otopine primijeniti na 20m² površine.

Proizvod primijeniti pomoću uobičajenih uređaja za prskanje ili prskalica s krupnim raspršivanjem. Dodati odgovarajuću količinu Alfasecta u potrebnu količinu čiste vode i promiješati. Primijeniti na površine posječene od strane štetnika, posebno u pukotine, procepe, iza pokuski i opreme. Leteci insekti: pri suzbijanju tretirati površine na kojima se zadržavaju insekti. Zohari i drugi gmižuci insekti: nanosite oko cijevi, iza i ispod armature i opreme. Ako insekti ulaze izvana, proizvod poprsakati na 10 cm širine kao barijeru oko vrata, prozora itd.

Manji bršnar suzbijanje se provodi rutinskim primjenom nakon čišćenja i prije uvođenja novog jata. Poprsakati sve okomite površine npr: zidove, pregrade i stupove te na prijelaze prema stropovima. Nije potrebno tretirati pod.

Crvena kokoška tekuti ili grnja: suzbijanje se provodi normalnom dozom na početku proizvodnog ciklusa prije nego što peradijanci u prostor. Poprsakati cijelu površinu kaveza, gnijezda, peradijaka i poda ako je moguće. Posvetiti posebnu pozornost na kutove, pukotine i rupe gdje se mogu nalaziti grnje.

Namjena

Alfasect je prikladan za suzbijanje štetnika u slijedećim prostorijama: kućanstva, javne zgrade, uključujući bolnice, hotele i restorane, kuhinje, te u industriji, uključujući pogone za preradu hrane. Proizvod se također može primijeniti u peradijancima za suzbijanje crvene kokoške tekuti ili grnje i manjeg bršnara.

Ovaj proizvod može se koristiti trajno u naseljenim prostorima isključivo kao zaštitna barijera u obliku trake, točke ili za tretiranje pukotina i rupa.

Ponovni ulazak u tretirane prostorije dopušten je 12 sati nakon primjene proizvoda.

Dobro prozračiti prostoriju prije ponovnog ulaska.

Ograničenja:

Ne dozvoliti da dođe do prolivanja proizvoda u vodene tokove, kanalizaciju i tlo.
Ne zagadivati vodene tokove upotrebjenom ambalažom.

Ne kontaminirati prehrambene proizvode, pribor za jelo i površine koje dolaze u kontakt s hranom.

Prije tretiranja prekriti spremnike za vodu.

Ne primjenjivati direktno na životinje.

Ukloniti ili prekriti alvarij prije upotrebe proizvoda.

Ne primjenjivati direktno na stoku i perad.

Opasno za pčele.

Nezastičene osobe i životinje držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Mjere zaštite pri radu:

Koristiti preporučenu zaštitnu opremu. Zaštitne naočale koje dobro prilijepaju uz lice ili masku za cijelo lice, zaštitne rukavice od nitrila, kloroprena ili butilne gume, zaštitno odijelo s dugim rukavima, zaštitnu obuću koja obuhvaća cijelo stopalo, po potrebi gumenu pregaču. Za zaštitu disajnog sustava potrebno je koristiti zaštitnu masku s A2-P kombiniranim filtrom.

Prilikom rada sprječiti kontakt s očima i kožom, sprječiti izlaganje izmisljele krošnje. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Nakon prekida rada treba skinuti radno odijelo te ruke i izložene dijelove kože oprati vodom i sapunom. Ociešćenju zaštitnu opremu oprati je udjele ouchere.

Skloniti ili prekriti hranu.

Pripremiti onoliko pripravka koliko je potrebno za primjenu.

Prva pomoć:

Ako se osoba ne osjeća dobro, zatražiti liječničku pomoć (ako je moguće pokazati upute za korištenje proizvoda ili njegov sigurnosno-tehnički list).

U slučaju udaranja osobe izvesti na svjež zrak.

Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira prati s puno vode uz dodatak sapuna, minimalno 20 minuta. Ukoliko simptomi ne prestaju, potražiti pomoć liječnika.

Oprati ruke. Čestim palcem i kažiprstom raširiti očne kapke i ispirati svako oko blagim mlazom vode minimalno 15 minuta. Izvaditi kontaktne leće nakon prvih 5 minuta ispiranja i nastaviti ispiranje. U slučaju bol i crvenila, potražiti pomoć liječnika.

Ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i ako nema smetnje pri disanju, usnu šuplinu ispirati većom količinom vode. Odmah potražiti pomoć liječnika tj. transportirati u najbližu zdravstvenu ustanovu. U slučaju trovanja nazvati Centar za kontrolu trovanja 01/23 48 342.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

U slučaju nesreće koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice, samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom, izbjegavati udisanje, kontakt s očima i kožom. Nestručne osobe držati dalje od mjesta nesreće.

Ostatak različenog proizvoda pokupiti inertnim materijalom za upijanje (npr. pijesak, zemlja, vermikulit) te prebaciti u odgovarajuće spremnike i držati na dobro ventiliranom prostoru do predaje na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada. Mjesto onecišćenja potom oprati vodom. U slučaju većeg razlijevanja te dolaska u okoliš, obavijestiti odgovornu osobu i/ili DUSZ na broj 112.

Ako je prostor zahvaćen požar, odmah treba započeti gašenje - vodenom maglicom, suhim prahom, pjenuom ili ugljikovim dioksidom uz obveznu upotrebu samostalnog uređaja za disanje sa stlačenim zrakom i zaštitne odjece za zaštitu od topline i vatre.

Uputa za sigurno odlaganje pripravka i njegove ambalaže:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalica, a ostatke od ispiranja utrljati pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebjeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Nakon primjene ispirati prskaliku.

Skladištenje:

Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj, nepoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu, u zaključanoj posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pica i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja, izbjegavajući visoke temperature i izravnu sunčevu svjetlost. Skladištiti pri temperaturi od 0°C do 40°C.

Upozorenje:

Proizvod se garantira za kvalitetu biocidnog pripravka dok se ono nalazi i prodaje u originalno zatvorenom pakiranju. Za štetu koje nastanu uslijed nestručne uporabe ili nepravilnogavanja sredstva, proizvođač ne snosi odgovornost.

UFI: SQGA-4VTP-A20T-ACT9

