

1L

# DELTA SECT 015 RTU



▶ TEKUTÝ INSEKTICÍDNÝ PRÍPRAVOK URČENÝ NA PRIAME POUŽITIE VO FORME  
POSTREKU PROTI HMYZU A ČLÁNKONOŽCOM VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH

Číslo oprávnenia: bio/1321/D/13/2/CCHLP

**Vzhľad prípravku:** Insekticídna vodná suspenzia v mechanickom postrekačovi určená na priame použitie, (RTU).

**Účinná látka:** deltamethrin  
**Chemická skupina:** syntetické pyrethroidy  
**Koncentrácia účinnej látky:** 0,15 g / L

Prípravok je určený pre profesionálne použitie

Prípravok môže vyvolať alergické reakcie

R 50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

N



NEBEZPEČNÝ PRE  
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

životného prostredia.

S60 Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Vid' špeciálne pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov.

**Dozrďte etiketu, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia**

Spôsob účinku:

Účinná látka deltametrín, patriaca medzi pyrethroidy, pôsobí kontaktné i požerom.

Deltametrín usmrčuje hmyz takmer okamžite tým, že blokuje prenos nervových impulzov.



**Účel použitia:**

Prípravok DELTA SECT 015 RTU je určený na hubenie všetkých vývojových štádií lezúceho hmyzu, ako švábi, rusi, mravce, blchy, ploščice, rybenky a pod, vo vnútorných priestoroch obytných budov i komerčných objektov.

**Návod na použitie:**

Pred použitím prípravku DELTA SECT 015 RTU nádobu niekoľkokrát dôkladne pretrepte. Otvorte trysku nastavením symbolu sprej a silným opakovaným stlačením páčky prípravok aplikujte. Proti mravcom aplikujte prípravok okolo vchodov do hniezd, na cestičky, alebo ako bariéru na miesta ich prenikania do vnútorných priestorov. Proti ostatným druhom aplikujte prípravok na všetky miesta, kde sa hmyz vo dne vyskytuje a vyhľadáva potravu, a kde sa v noci ukrýva. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým skryšiam, štrbinám, prasklinám a trhlinám, najmä v blízkosti vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia, podlahových lišt a pod.

**Dávkovanie:**

Prípravok aplikujte tak, aby všetky povrchy, ktoré majú byť ošetrené, boli rovnomerne navlhčené. Postrek zostáva účinný najmenej 10 dní, nesmie však byť umytý, zotretý, zaprášený, alebo inak znehodnotený.

**Bezpečnostné opatrenia:**

- Pred ošetrením zaistite neprítomnosť ľudí a domácich zvierat v miestnostiach, kde bude aplikovaný prípravok.
- Miestnosti môžu byť opätovne používané až po uschnutí ošetrených povrchov a po vyvetraní.
- Pred aplikáciou prípravku odstráňte z miestnosti, dôkladne prikryte, alebo uschovajte do skrine potraviny, riad, akvária s rybami.
- Nestriekajte na zariadenie alebo na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s nezabalenými potravinami
- Prípravok uchovávajte iba v tesne uzavretom pôvodnom obale, mimo dosahu nepovolných osôb, najmä detí.
- Nestriekajte na posteľnú bielizeň, oblečenie a detské hračky.
- Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite cigarety.
- Pri práci s prípravkom zabráňte kontaktu s kožou a očami.
- Po použití si umyte ruky a tvár s mydlom a vodou.

**Príznaky otravy:**

Prípravok obsahuje insekticíd zo skupiny pyrethroidov.

Pri akútnej otrave sa môže objaviť rozrušenie, gastrointestinálne príznaky, tras, závrat, letargia, nevoľnosť a vracanie, bolesť v hornej časti trupu, svalové zškľaby končatín, kŕče a bezvedomie (pri zasiahnutí veľmi vysokou dávkou).

**Prvá pomoc:**

Po vdýchnutí: Vyvedte postihnutého z miesta expozície, umiestnite ho v pohodlnej pozícii, v ľahu alebo v sede, udržujte ho v klude a teple. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte oči vlažnou čistou vodou po dobu aspoň 15 minút. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich. Vyhnite sa silnému prúdu vody, ktorý môže spôsobiť poškodenie rohovky. Ak príznaky pretrvávajú, poradte sa s očným lekárom.

Pri zasiahnutí kože: Opláchnite vlažnou čistou vodou. Odstráňte kontaminovaný odev. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a podajte veľké množstvo vody na pitie (ak je postihnutý pri vedomí). Zaistite lekárske ošetrovanie.

Lekárom môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným Toxikologickým informačným centrom, FNŠP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
Telefón: 421 254 774 166, Fax: 421 254 774 605; Mobil: 421 911 166 066;  
e-mail: ntic@ntic.sk

**Skladovanie:**

Prípravok skladujte v originálnom obale. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú, na chladnom, dobre vetranom mieste, pri teplote 0 až +30 ° C, oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, teplom a vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zaistite nádoby pred mechanickým poškodením.

**Zneškodnenie zvyškov prípravku a jeho obalov:**

Nevyhádzajte do komunálneho odpadu. Nevylievajte do kanalizácie. Zabráňte znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zvyšky prípravku, prípravok ktorému uplynula doba použiteľnosti a prázdne obaly vráťte predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo odovzdajte subjektu poverenému na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Je zakázané spaľovať prázdne obaly.  
**UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE ANI VYPLÁCHNUTÉ PRÁZDNE OBALY NA INÉ ÚČELY**

**Balenie:** 1L

**Číslo šarže a dátum výroby:** pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

**Výrobca:** Shard Europe b.v.b.a.  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek  
Belgium

**Dovozca do SR:**

