

IMIDASECT



Insekticídna nástraha vo forme gélu na priame použitie proti rusovi domovému (*Blattella germanica*), švábovi obyčajnému (*Blatta orientalis*), švábovi hnedopásavému (*Supella longipalpa*) a švábovi americkému (*Periplaneta americana*) a ich nymfám.

Účinná látka: Imidacloprid 21,50 g/kg

Vzhľad prípravku: gél bielej až béžovej farby

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené pod zn: bio/778/D/13/5/CCHLP

Upozornenie: PRED POUŽÍVANÍM SI PREČÍTAJTE ETIKETU.



**NEBEZPEČNÝ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

S60: Tento materiál a jeho obaly musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:

Po použití prípravku Imidasect a pred jedlom si umyte ruky mydlom a vodou.

Neaplikujte nástrahu v blízkosti nebalených potravín

Neaplikujte gél na plochy, kde sú nebalené potraviny uložené, upravované alebo konzumované.

Neaplikujte nástrahu do blízkosti potravín, jedálničných príborov a riadu ani na plochy, s ktorými prichádzajú potraviny do kontaktu.

Chráňte potraviny, kuchynské potreby a prístroje pred kontamináciou počas použitia.

Neaplikujte gél na miesta prístupné deťom a domácim zvieratám.

Toxický pre ryby.

Neznečisťujte vodné nádrže, vodné toky alebo kanalizáciu prípravkom alebo jeho obalom.

Dodržiujte odporúčané dávkovanie a všetky podmienky v ňom odporúčané. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku ak je v originálnom obale a používaný odporúčaným spôsobom.

Dozrúťe pokyny, aby ste sa vyvarovali ohrozenia zdravia ľudí a poškodenia životného prostredia.

Dozrúťe presne návod na použitie, bezpečnostné opatrenia a, odporúčané dávkovanie a všetky podmienky bezpečného používania. Prípravok používajte iba na účely, pre ktoré je určený.

Pri používaní tohto prípravku by mala byť dodržiavané všetky pravidlá bezpečnosti práce, za ktorú máte plnú zodpovednosť, s ohľadom na všetky faktory a podmienky, za ktorých je prípravok aplikovaný. Výrobca zodpovedá za kvalitu a účinnosť prípravku len v prípade, že bol predaný v originálnom balení, skladovaný a používaný odporúčaným spôsobom.

Spôsob účinku

Imidacloprid, účinná látka prípravku Imidasect patrí medzi neonicotinoidy, sa viaže na neuróny hmyzu. Táto väzba pôsobí narušenie prenosu nervových impulzov, čo je pre hmyz smrteľné. Rusi a šváby sú lákani potravinovými atraktantmi obsiahnutými v géle. Gél pôsobí požíieraním aj kontakte na dospelé jedince i nymfy. K úhynu dochádza počas 10 dní. Hnúť aj rúsi a šváby požíerajúci v úkrytoch trus jedincov, ktorí mimo úkryt gélu. Gél aplikovaný za normálnych podmienok zostáva pre švábov a rusov aktívnou a účinnou návnadou po dobu 2 mesiacov.

Návod na použitie:

Pred aplikáciou prípravku Imidasect odstráňte, pokiaľ možno, všetky prirodzené zdroje potravy rusov a švábov z ošetrovaného priestoru, vrátane odpadkov. Prípravok aplikujte na všetky miesta, kde je teplota nižšia ako 50°C, kde sa rúsi a švábi ukrývajú a vyhľadávajú potravu a vodu, t.j. do rohov miestností, do praskín, dutín a škár, rozvodov klimatizácie, pod líšty podlahy, pod prístroje, pod rozvody vody a pod. Pri kontrolách gél podľa

potreby dopĺňajte. Gél môže byť do prostredia aplikovaný, bez nutnosti prerušenia akejkoľvek činnosti a aktivity.

Imidasect môže byť používaný vo vnútri budov všetkých typov, v bytoch, reštauráciách, kuchyniach verejného stravovania, potravinárskych výrobniciach a prevádzkach, hoteloch, školách, zdravotníckych zariadeniach, v dopravných prostriedkoch, skladoch, v priemyselných objektoch a pod.

Aplikačné dávky:

DRUH HMYZU	MIERNY STUPEŇ ZAMORENIA	SILNÝ STUPEŇ ZAMORENIA
Rus domový Šváb hnedopásavý	1 kvapka o hmotnosti 0,1 g/m ²	2 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m ²
Šváb obyčajný Šváb americký	2 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m ²	3 kvapky o hmotnosti 0,1 g/m ²

Poznámka: 1 kvapka o hmotnosti 0,1 g má priemer 5 mm

Neaplikujte nástrahu na miesta často čistené, kde môže byť zničená alebo odstránená

Neaplikujte nástrahu na miesta obývaná vodou, ktorá môže nástrahu zničiť.

Neaplikujte nástrahu na plochy ošetrované insekticídnyim postrekom

Neaplikujte nástrahu nepostrekyvané zariadenia insekticídny.

Nástraha môže spôsobiť odfarbenie textilu.

Prvá pomoc

Všeobecné odporúčania: Postihnutého vynesť z nebezpečného priestoru. Ak je pravdepodobné, že pacient stratí vedomie, prepravujte ho k lekárovi v stabilizovanej polohe na boku.

Odstáňte ihneď prípravok kontaminované alebo nasaknuté oblečenie.

Pri zasiahnutí kože: Ihneď umyte zasiahnuté miesto mydlom a veľkým množstvom vody.

Pri zasiahnutí očí: Pri zasiahnutí očí vymyte dôkladne vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri náhodnom prehltnutí: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte ihneď lekárske ošetrovanie.

Dôležitá informácia:

Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s Národným Toxikologickým informačným centrom, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Telefón: 421 254 774 166

Fax: 421 254 774 605

Mobil: 421 911 166 066

e-mail: ntic@ntic.sk

Skladovanie

Skladujte v originálnych obaloch v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, mimo dosahu detí a domácich zvierat, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok. Nevystavujte priamemu slnečnému svitu a teplotám vyšším ako 40°C. Chráňte pred mrazom.

Odstaňovanie obalov a zvyškov prípravku

Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte ani po vypláchnutí.

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

Výrobca:

ShardaEurope b.v.b.a.

Jozef Merensstraat 142,

1702 Dilbeek

Belgium

Dovozca do SR:

